Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1974–75 (Coleoptera)

STIG LUNDBERG

Lundberg, S.: Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1974–75 (Coleoptera). [Finds of beetles new to Sweden reported in 1974–75 (Coleoptera)]. - Ent. Tidskr. 98:7–9 (1977). Lund, Sweden 20 May 1977. ISSN 0013-886X.

A list of species reported as new for Sweden in the years 1974–75 is given.

S. Lundberg, Skeppsbrogatan 9, S-951 35 Luleå, Sweden.

I likhet med vad som skett för bl a fjärilar senaste åren kan det vara av intresse för landets skalbaggssamlare att årliga sammanställningar göres av för landet rapporterade nytillkomna arter. Därvid utgår jag från att vederbörande rapportör själv mer i detalj separat redovisar sina fynd, vilket f ö i vissa fall redan skett. För fullständighetens skull tar jag här upp åren 1974 och 1975 och räknar då in arter, som helt klarlagts under åren även om fynden i vissa fall gjorts mycket tidigare.

Carabidae

Amara hyperborea Dej. 1 exemplar taget under en sten mellan Adolfström och Peljekajse i P.lpm. i juli 1965 (Martti och Heikki Attila enligt J. Muona, ex. i coll SL). Arten är närmast känd från norra Finland.

Hydrophilidae

Helophorus obscurus Muls. Exemplar i Thomsons samling från Sk. (Lunds museum) har bestämts av R. Angus. Även tagen i Sk. (RB), Öl. (NB) och Hall. (GG). (Ent. Tidskr. 97:117–118).

Silphidae

Agyrtes bicolor Cast. 1 exemplar sållat vid Häckebergasjön, Sk. i januari 1974 (AC). Arten är närmast känd från Danmark.

Eocatops lapponicus Szymszacowski. Nyligen beskriven efter material som insamlats i Reivoreservatet P.lpm. av förf. (Se Ent. tidskr. 96:3–7, 97:15). I material insamlat i Kalixtrakten i Nb. 15.5.70 av Conny Holmqvist fanns 1 exemplar av samma art och dessutom fick jag 1 exemplar 14.9.76 vid sållning av stubbar med myran *Formica lemani* vid Nirra, Lu. Lpm.

Liodidae

Liodes litura Steph. Slaghåvad i 1 exemplar 13.7.73 vid Båtfors, Upl. (RB). Arten är känd från övriga Norden.

Agathidium pulchrum Lec. Erhållen i 1 exemplar 27.6.71 vid Blåkölen norr Niemisel, Nb. och likaså i 1 exemplar 14.8.75 vid Pellonen i östra Finland nära ryska gränsen. Arten är närmast känd från Nordamerika (båda leg. SL). Se sidan 5 i detta häfte.

Scydmaenidae

Cephennium gallicum Gglb. Erhållen i flera exemplar i kompost på Lidingö, Upl. vintern 1974–75 f ö tillsammans med 1 exemplar av *Annomatus diecki* Rtt. 2:a svenska ex. (LM). Närmast känd från Danmark.

Neuraphes personi Franz. Nyligen beskriven efter 2 exemplar från Nb. tagna 11.10.70 (KP) respektive 27.10.74 (SL). (Ent. Tidskr. 96:1–2).

Ptiliidae

Ptinella microscopica Gillm. Enstaka exemplar tagna i Nb. (SL), Dlr. (OS), Jmt. (JB), Ög., Upl. (BE). (Ent. Tidskr. 96:8).

Staphylinidae

Micropeplus latus Hampe. Påträffad som ny för norra Europa (närmast känd från Tjeckoslovakiet) i Halland hösten 1975 (GG). Dessutom erhållen i Sm, Hornsö 2.5.76 (SL) och uppenbarligen förbisedd.

Oxyteles saulcyi Pand. Erhållen i 1 exemplar genom sållning vid basen av en alm i Örup, Sk. 30.4.73 (AD). Känd från Danmark närmast.

Diglotta submarina Kies. Tagen i 1 exemplar vid Gullholmen i Boh. redan 19.7.59 (UH). Känd från såväl Norge som Danmark.

Oligota pumilio Kies. Svenska materialet av *Oligota pusillima* Gr har visat sig innehålla denna mellaneuropeiska art. Hittills konstaterad från Sk. (RB), Öl., Gotl., G. Sandön (SL) och Upl. (TL och PP).

Phytosus spinifer Curt. Påträffad i 1 exemplar 29.10.75 i Hall. (GG) och i stort antal på Galterö i Vg. i aug 1976 (GG och AT). Närmast känd från Danmark.

Atheta taxiceroides Munst. 2 exemplar sållade på Hertsön utanför Luleå 27.10.74 och ett tredje exemplar 18.10.75 på samma lokal (SL). (Ent. Tidskr. 96:10).

Pselaphidae

Euplectus bonvouloiri rosae Raffr. Erhållen genom såll av innanmätet i bokstubbar 11.7.70 på Hallands Väderö, Sk. (RB, Ent. Tidskr. 97:118–119). Dessutom funnen i Köpenhamn på samma sätt (Durehave 13.9.66 SL).

Grammoplectus spinolae Aubé. Tagen i 1 exemplar i Hornsö-trakten i Sm. 22.7.69. Arten är ny för Norden (RB, Ent. Tidskr. 97:119).

Bibloporus ultimus Guilb. En mellaneuropeisk art som upptäcktes hösten 1975 i Skäralid, Sk. i flera exemplar (AC), men tagen i 1 exemplar redan 1.7.65 på samma lokal (SL).

Eucnemidae

Dirrhagus emyi Roug. Ett exemplar taget 28.7.74 i Halltorp på Öl. (PC). Se f ö i Ent. Tidskr. 96:11, varvid bör påpekas att i stället för kammade antenner bör stå sågade.

Throscidae

Throscus duvali Bouv. Tagen på ett par lokaler i Kalmar-trakten, de första 17.3.74 (BA). (Ent. Tidskr. 95:182).

Dermestidae

Attagenus longicornis Pic. Erhållen i Sk. inomhus (SP) och kläckt ur larvmaterial från Vg. Göteborgs museum (SL). Arten är känd från Danmark närmast och bör betraktas som införd.

Attagenus smirnovi Zhantiev. Fyra exemplar tagna inomhus i Boden, Nb. finns i Lunds museums samling. Även denna är införd i Danmark.

Nitidulidae

Meligethes haemorrhoidalis Först. Tagen i 1 exemplar genom slaghåvning 25.8.74 i Maltesholm, Sk. (RB). Närmast känd från Danmark. (Ent. Tidskr. 97:119).

Cryptophagidae

Atomaria analis Er. Tidigare känt material av denna art har i Norden visat sig vara *Atomaria borealis* Sjöb. Den äkta *A. analis* har dock konstaterats vara vanlig i södra Skåne (leg. AD, det. JB).

Atomaria consanguinea Johnson. Beskriven efter bl a svenskt material från Sk. (RB). Dessutom tagen i Sm. (BE), Öl. (SL) och Gstr. (RB). (Ent. Tidskr. 97:120).

Lathrididae

Lathridius bifasciatus Rtt. Erhållen i 1 exemplar inomhus 1974 i Stockholm, Upl. (BE). Bör betraktas som införd.

Serropalpidae

Orchesia luteipalpis Muls. 1 exemplar taget i Foss, Heiström, Bog. redan 16.9.63 (UH). Arten är närmast känd från Norge.

Jag vill passa på att framföra ett hjärtligt tack till samtliga rapportörer.

AC = Ambjörn Carlsson, AD = Allan Dufberg, AT = Anders Törnwall, BA = Bengt Andersson, BE = Bengt Ehnström, GG = Gösta Gillerfors, JB = J. R. Bergvall, KP = Kurt Persson, LM = Lars Magnius, NB = Nils Bruce, OS = Oskar Sjöberg, PC = Peter Cederström, PP = Per Prutz, RB = Rickard Baranowski, SL = Stig Lundberg, SP = Sven Persson, TL = Tor-Erik Leiler, UH = Uno Holmer.